

# 拿鐵嚼錠 100公絲

## La Ferrum Chewable Tablets 100mg

衛署藥製字第 046758 G-8536 號

### 【成分】

每錠含有 Iron 100mg (as ferric hydroxide polymaltose complex 300mg)。

### 【賦形劑】

Sugar powder, Milk calcium, Aspartame, Magnesium stearate, Crospovidone XL, Cocoa powder, Vanillin powder, Magnesium aluminium silicate.

### 【特性】

此錠特別發展來治療鐵質缺乏症，此錠含有 100mg 之鐵質，可一天給藥一次。

因本劑之鐵係以 iron polymaltose complex 之形式給予是非離子的，所以服用此錠將不會引起一般離子性鐵鹽常見的副作用，如胃腸障礙，牙齒 色，金屬味及與其他食物、藥物之相互作用。此錠除了本身有很良好的耐受性外，還有很高的安全域。存在於此錠中之 iron polymaltose 的口服毒性很低，所以意外過度服用所造成之鐵中毒可不必顧慮。本劑經各種身體可用率實驗及臨床比較證實鐵之吸收利用與亞鐵鹽完全相同。

### 【適應症】

預防及治療鐵質缺乏症、缺鐵性貧血症。

### 【禁忌】

1. 人體中，鐵質過分負荷者。
2. 鐵質利用阻礙者。
3. 如果是傳染性或腫瘤性鐵質不足之貧血症，鐵質將會儲存在 RES 中，鐵質之代謝及利用將不會發生效用，除非原發疾病完全痊癒。

### 【用法用量】

正常情況，每天一錠，任何時間服用均可。隨病人喜愛，可隨時飲用液體物。此錠也可以和液體物一起吞食，如果需要，劑量可增加為一天服用二次，每次一錠。依據醫師指示，在餐前、餐後或一起服食均可。為能補充體內鐵質之庫存，在血值 (Hb, Ht, 紅血球) 正常後，最好再繼續服用一個月。

### 【治療持續時間】

Hb 值為 90g/l 或以上時的劑量是每天一錠 (100mg)

體重 (Kg)	治療持續時間 (週)					
	Hb60 g/l	Hb75 g/l	Hb90 g/l	Hb105 g/l	Hb120 g/l	Hb135 g/l
35	7	6	7	6	5	4
40	8	7	8	7	6	5
45	9	7	8	7	6	5
50	9	8	9	7	6	5
55	10	9	9	8	6	5
60	11	9	10	8	7	5
65	12	10	10	9	7	5
70	12	11	11	9	7	5
75	13	11	11	9	7	6
80	14	12	12	10	8	6
85	15	13	13	10	8	6
90	15	13	13	11	8	6

### 【注意事項】

糞便將呈現暗黑色，此是以鐵質治療所會發生的，沒有關係。

本品含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

本藥須由醫師處方使用。

儲存 25°C 以下。

### 【包裝】

2-1000 錠鋁箔盒裝。



委託製造者：

倍斯特醫藥生物科技股份有限公司

台中市北屯區崇德路二段 51 號 3 樓之 5

製造廠：

歐帕生技醫藥股份有限公司

新竹縣湖口鄉光復路 1 號

9188220.01